

# Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”

## Primer Simposio COVID-19



**Título:** Formas clínicas de presentación del COVID 19 en las personas mayores.

**Autor:** Yanet Pérez Mesa.

Especialista en Primer grado en Gerontología y Geriatria.Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras.

## Coronavirus en el paciente mayor: una emergencia geriátrica.

Journal List GeroScience v.42(2); 2020 Apr PMC7145538



[GeroScience](#). 2020 Apr; 42(2): 505–514.

PMCID: PMC7145538

Published online 2020 Apr 10. doi: [10.1007/s11357-020-00186-0](https://doi.org/10.1007/s11357-020-00186-0)

PMID: [32274617](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32274617/)

SARS-CoV-2 and COVID-19 in older adults: what we may expect regarding pathogenesis, immune responses, and outcomes

[Janko Nikolich-Zugich](#),<sup>1,2</sup> [Kenneth S. Knox](#),<sup>3,4</sup> [Carlos Tafich Rios](#),<sup>5</sup> [Bhupinder Natt](#),<sup>3</sup> [Deepta Bhattacharya](#),<sup>1</sup> and [Mindy J. Fain](#)<sup>2,5</sup>

► [Author information](#) ► [Article notes](#) ► [Copyright and License information](#) [Disclaimer](#)



Según el Programa Regional de Geriatría de Toronto, sólo entre el 20 y el 30% de los pacientes ancianos con COVID-19 declaran haber tenido fiebre y muchos de ellos no presentar los síntomas que asociamos con este nuevo virus, como la tos y las dificultades respiratorias.



TOPDOCTORS®

## Los pacientes mayores experimentan síntomas inusuales de COVID-19: ¿se están pasando por alto?

Escrito por:

[Dr. Tarun Solanki](#)

Especialista en medicina interna

Publicado: 16/07/2020

### Síntomas más frecuentes en los pacientes mayores.

Delirio	Debilidad generalizada	Mareos	Dolor en el pecho
Malestar	Conjuntivitis	Dolores de cabeza	Diarrea
Decadencia funcional	Aumento de la producción de esputo	Rinorrea	Náuseas y vómitos
Caídas	Anorexia	Hemoptisis	Anosmia

Research Article

## **Clinical Characteristics and Outcomes of 821 Older Patients With SARS-Cov-2 Infection Admitted to Acute Care Geriatric Wards**

### **A Multicenter Retrospective Cohort Study**

Lorène Zerah, MD, PhD,<sup>1,2,\*</sup> Édouard Baudouin, MD,<sup>1</sup> Marion Pépin, MD, PhD,<sup>3,4</sup> Morgane Mary, MD,<sup>5</sup> Sébastien Krypciak, MD,<sup>6,7</sup> Céline Bianco, MD,<sup>8,9</sup> Swasti Roux, MD,<sup>10</sup> Ariane Gross, MD,<sup>11</sup> Charlotte Toméo, MD,<sup>1</sup> Nadège Lemarié, MD,<sup>12</sup> Antoine Dureau, MD,<sup>13</sup> Sophie Bastiani, MD,<sup>14</sup> Flora Ketz, MD,<sup>15</sup> Clémence Bouilly, MD,<sup>16,17</sup> Cédric de Villelongue, MD,<sup>18</sup> Mouna Romdhani, MD,<sup>19</sup> Marie-Astrid Desoutter, MD,<sup>3,4</sup> Emmanuelle Duron, MD, PhD,<sup>5,20,•</sup> Jean-Philippe David, MD, PhD,<sup>6,7</sup> Caroline Thomas, MD,<sup>8</sup> Elena Paillaud, MD, PhD,<sup>7,21</sup> Pauline de Malglaive, MD,<sup>11</sup> Eric Bouvard, MD,<sup>12</sup> Mathilde Lacrampe, MD,<sup>13</sup> Elise Mercadier, MD,<sup>14</sup> Alexandra Monti, MD,<sup>15</sup> Olivier Hanon, MD, PhD,<sup>16,17</sup> Virginie Fossey-Diaz, MD,<sup>18</sup> Lauriane Bourdonnec, MD,<sup>19</sup> Bruno Riou, MD, PhD,<sup>22,23</sup> Hélène Vallet, MD, PhD,<sup>8,9,•</sup> and Jacques Boddaert, MD, PhD<sup>1,9</sup>; on behalf of the APHP/Universities/Inserm COVID-19 Research Collaboration

En este estudio se describieron las características clínicas y los desenlaces de adultos mayores con diversas comorbilidades hospitalizados por COVID-19, encontrándose que sólo el 55% tuvo fiebre, el 25 % delirium y el 45 % tos seca, por lo que la fiebre no necesariamente se presenta en este sector vulnerable con esa patología.

Los síndromes geriátricos son una forma de presentación frecuente de las infecciones en las personas mayores, las caídas, el deterioro funcional, el delirium y la incontinencia son algunos de los más observados en pacientes con SARS-CoV-2



## “Médicos dicen que los adultos mayores con COVID-19 presentan síntomas inusuales”

La doctora Laura Perry, profesora adjunta de medicina en la Universidad de California-San Francisco, tuvo una paciente de 80 años, la cual presentó lo que parecía ser un **resfriado** antes de caer en un **estado de confusión**. En el hospital, no podía identificar dónde estaba ni permanecer despierta durante un examen. Perry diagnosticó **delirio hipoactivo**.

El doctor Anthony Perry, profesor asociado de medicina geriátrica en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, habla de una mujer de 81 años con **náuseas, vómitos y diarrea** que dio positivo para COVID-19 en la sala de emergencias.



Otra paciente de 80 años presento síntomas como náuseas y vómitos, pero **sin tos, fiebre o dificultad para respirar**.

El doctor Quratulain Syed, geriatra de Atlanta, Georgia, cuenta sobre un hombre de 80 años al que trató a mediados de marzo. Durante unos días, este paciente, que padecía del corazón, de diabetes y de un deterioro cognitivo moderado, **dejó de caminar, se volvió incontinente y profundamente letárgico. Pero no tenía fiebre ni tos**. Su único síntoma respiratorio: estornudar de vez en cuando.







## **Conclusiones.**

Las personas mayores suelen presentar síntomas inusuales en cualquier circunstancia médica y esto está ocurriendo también en el contexto de la COVID-19.

La aparición de los síndromes geriátricos, la descompensación de las comorbilidades y los síntomas atípicos forman parte del cuadro clínico en el adulto mayor, lo que confunde la identificación y tratamiento de la misma.